

### **Zalecenia po poddaniu pracy protetycznej:**

- Należy utrzymywać należytą higienę jamy ustnej i uzupełnień protetycznych.
- Protezy ruchome mogą powodować ból w obrębie błony śluzowej (odleżyny) nawet w kilku miejscach, w takim przypadku konieczna jest korekta w gabinecie.
- W przypadku protez ruchomych należy zawsze zgłosić się na wizytę kontrolną 1-2 tygodnie po oddaniu protezy.
- W przypadku dolegliwości bólowych lub uczucia niewygodności należy niezwłocznie zgłosić się na wizytę kontrolną.
- W celu utrzymania właściwej higieny protezy ruchomej należy używać odpowiednich tabletek czyszczących lub szczotkowanie przy użyciu zwykłego szarego mydła. Nie należy umieszczać protez w roztworze tabletek na dłużej niż 15 minut.
- Nie wolno samodzielnie dostosowywać pracy protetycznej. Postępowanie takie skutkuje utratą gwarancji.
- Zdejmowanie protez ruchomych na czas snu nie jest konieczne, Zalecane ewentualnie w przypadku protezy całkowitej dolnej.
- Celem utrzymania gwarancji należy zgłosić się na kontrolną wizytę po okresie 6 miesięcy od oddania protezy.